



## What you need to know about...

### ENFERMEDAD POR PNEUMOCOCO EN ADULTOS

- REALIDAD:** La enfermedad por pneumococo puede prevenirse con una vacuna segura y efectiva.
- REALIDAD:** La neumonía y la influenza juntas, representan la séptima causa más importante de muerte en los Estados Unidos y la quinta principal causa de muerte entre personas de 65 y más años.
- REALIDAD:** La vacuna contra pneumococo está cubierta en su totalidad por la parte B de Medicare, si el proveedor de salud acepta el monto aprobado por Medicare.
- REALIDAD:** Cada año en los Estados Unidos, la enfermedad por pneumococo causa aproximadamente 500,000 casos de neumonía (infección de los pulmones), 60,000 casos de bacteremia (infección del torrente sanguíneo) y 3,300 casos de meningitis.
- REALIDAD:** La enfermedad por pneumococo es responsable de más de 40,000 muertes al año en los Estados Unidos. Aproximadamente un 50% de dichas muertes podrían ser prevenidas con el uso de la vacuna contra pneumococo.
- REALIDAD:** La neumonía por pneumococo es responsable de más de 175,000 hospitalizaciones al año y es el tipo de neumonía bacteriana más común en personas de 65 y más años.
- REALIDAD:** Se estima que únicamente 54% de adultos de 65 y más años y 8 a 10% de personas en riesgo que deberían vacunarse, han sido vacunados.
- REALIDAD:** La vacuna contra pneumococo puede ser administrada en cualquier momento y época del año.
- REALIDAD:** La enfermedad por pneumococo no puede contraerse por administración de la vacuna.
- REALIDAD:** Para personas de 65 años o mayores, se recomienda una dosis única de vacuna contra pneumococo. Algunas personas que tenían 65 años o menos cuando fueron vacunadas, podrían necesitar un refuerzo a los 5 años.